

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ LAP

**/5./ Dokumentum címe: Kolporraphia anterior et kolpoperineorrhaphia
(mellső és/vagy hatsó hüvelyplasztika)**

Beteg neve:.....TAJ száma.....

Tisztelt betegünk !

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében Önnél a hüvely plasztikai műtete vált szükségessé. A Szülészeti-Nőgyógyászati osztály a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy-- mindent mérlegelve--döntsön, es beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A hüvelyfalak, s mögöttük (a hólyag illetve a végbél süllyedésének helyreállítása, illetve helyzet javítása.

A beavatkozás célja:

A mellső hüvelyfal és a húgyhólyag, illetve a hátsó hüvelyfal és a végbél közel eredeti helyzetének visszaállítása, mely megszünteti, illetve javíthatja a vizelettartási es székletürítési problémáját. Javíthatja közönségi gondjait is.

Hogyan történik a beavatkozás?

A beavatkozást az altató orvos által javasolt és Ön által engedélyezett érzéstelenítési módban végezzük. A műtét előtt, kivizsgálást követően, a végbelet beöntés segítségével kitisztítjuk és hüvelyöblítést végzünk. A műtéttel a lesüllyedt mellső és /vagy hatsó hüvelyfalat szűkítjük es úgy megemeljük, hogy a hólyag és/vagy a végbél kedvező helyzetbe kerüljön.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos alapbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása. túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtetek es azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Utóvérzés, vérömleny, vérzés a húgyhólyagból, sipolyképződés, sebszétválás, vizeletürítési zavarok, hólyag vagy végbél sérülése.

Ezeknek az esetleges, de ritka szövődményeknek az ellátására, gyógyítására kórházunkban a feltételek biztosítva vannak.

Műtét utáni történések:

Műtét után enyhe hasi fájdalom, hüvelyi, végbéltáji "égő " érzés előfordulhat. Kisfokú vérzés lehetséges, mely fokozatosan megszűnik. A műtétnél állandó katétert is felhelyezhetünk, melyet kb. 24 óra múlva eltávolítunk. Előfordulhat, hogy spontán nem tud vizelni pár napig , vagy pár alkalommal, ezért katéterezni kell. Amennyiben vizeletét jól tudja üríteni kb. a 4-5 napon hagyhatja el osztályunkat.

Várható következmények:

Ideális esetben egy ilyen műtet panaszait 5-15 évre megoldhatja, de az évek során panaszai kiújulhatnak.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Fiatalabb korban hüvelyi torna. Idős korban, amikor a műteti beavatkozás ellenjavallt hüvelygyűrű felhelyezése történhet, vagy inkontinencia betét viselése. Néha a gyógyszeres kezelés is szóba jöhet.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétől számított 6 hét múlva kontroll vizsgálat, addig kímélő életmód, nemi élet mellőzése. A műteti seb tisztán tartása.

A műtét elmaradásának következményei:

Meglevő vizelettartási problémái fokozódhatnak, a legrosszabb esetben bekövetkezhet a hüvely teljes kifordulása a méhével együtt.

Beleegyező nyilatkozat:

A hüvely plasztikai műtétről a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Szekszárd.....év.....hó.....nap.....óra.....perc

Elutasító nyilatkozat:

A kezelőorvos részletes felvilágosítása--, amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazza--ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy
tanú aláírása

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása
tanú aláírása

Szekszárd,év.....hó.....nap.....óra.....perc