

Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
Szekszárd

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ LAP

/7./ Dokumentum címe: **Szülés, szívfogó, császármetszés.**

Beteg neve:..... TAJ száma:.....

Tisztelt betegünk!

Tájékoztatjuk, hogy Ön belátható időn belül szülni fog. Ennek kapcsán szükség lehet gyors befejezésére, szívfogó végzésére, vagy császármetszés műtetre. A Szülészeti - Nőgyógyászati Osztály a szülesről illetve annak műtétes befejezéséről szeretne tájékoztatást adni, hogy –mindent mérlegelve– döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A hüvelyi szülés a magzat világra jövetelének természetes útja. Előfordulhat olyan helyzet, hogy a szülés utolsó fázisában, a kitolási szakban szívfogót kell alkalmazni a magzat megszületése érdekében. Ez műtétes szülésbefejezés. A szülés, illetve a terhesség bármely szakaszában anyai, vagy magzati érdekből illetve okból szükség lehet császármetszésre, melynek alkalmazásával a magzat a természetes szülő utakat megkerülve jön a világra. A szívfogó és a császármetszés nem egymás alternatív lehetőségei.

A beavatkozás célja:

Szülés: amennyiben minden lehetőség adott a magzat a szülés tágalási és kitolási szakasza után a szülőcsatornán keresztül jön világra. E mód a természetes és élettani folyamat. Szívfogó: Eltűnt méhszájnál, amikor a magzati koponya a medence üreg alján helyezkedik és a magzat életét illetve egészségét veszélyeztető okból szülés gyors befejezésére van szükség, akkor alkalmazható megoldás. Császármetszés: a terhesség és a szülés bármely időszakában anyai vagy magzati okból nem javasolt, vagy nem lehetséges a természetes szülés, ezért a magzatot hasi műtét segítségével kell világra hozni.

Hogyan történik a beavatkozás?

Hüvelyi szülésnél: a fájások kezdete után a tágalási szak alatt „tűnik” el a méhszáj, majd ezt követi a kitolási szak, mely alatt a magzat a szülőcsatornán végighalad. Szívfogónál: a medence ürege alján elhelyezkedő koponyára egy harang alakú eszközt helyezünk fel majd vákuumot létesítünk benne, melynek következtében az eszközzel húzást lehet gyakorolni a fejre és így segíteni a magzat megszületését. Császármetszésnél: az altató orvos által javasolt érzéstelenítési módban, a megfelelő előkészítést követően, az előző műtét vagy műtétek metszésétől, az Ön adottságaitól és a magzat érdekétől függően nyitjuk meg a hasat a szeméremcsonttól a köldökig, vagy a szeméremcsont felett harántul.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élevezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Nagy mértékben emelheti a szövődményeket a terhesség alatt kialakult toxemia. Szülésnél, szívfogónál: láz, vérzés, vérékenység kialakulása, méh, méhnyak, hüvely, valamint a végbél repedése sérülése mely következtében a későbbiekben széklettartási gondjai is lehetnek. Csillapíthatatlan vérzés esetén hasi műtetre és méhének eltávolítására is kényszerülhetünk. Császármetszésnél: csillapíthatatlan vérzés, méh, méhnyak, húgyhólyag és húgylevezető, belek és erek sérülése, mely miatt akár a méh eltávolítására, bélműtetre illetve a hólyag és a veseelvezető műtétjére kényszerülhetünk. Mindhárom esetben: Vérzés miatt a szülés vagy császármetszés alatt és után is előfordulhat, hogy vért ill. vérkiszármányt kell kapnia. A hüvelyben, a gáton és a hasban ill. a hasfal szövetei között kialakulhat folyadékgyülem, ill. vérömleny. Ennek megelőzésére ill. lebocsátására drain csövet alkalmazunk. Sebfertőződés, gennyesedés, tartósabb ágyhoz kötöttség esetén tüdőgyulladás, vérrögösödés (trombózis, embólia) is előfordulhat, ill. ezek miatt újabb műtetre kényszerülhetünk. Az esetleges szövődmények megelőzésére, ill. gyógyításukra mindent megteszünk.

Szülés illetve műtét utáni, történések:

A magzat megszületése után leválik a lepény,- távozik, néha, amennyiben magától nem válik le, le kell választani. Ez altatásban, ill. ha erős vérzés miatt a gyorsasági is szükséges, bódításban történik. Ezt követi a gátseb hüvelysebz megvarrása. ill. a méh un. Bumm-kanállal történő kiürítése. Szüléstől számított két óra hosszat a szülőszobán kell maradni megfigyelésre, ha minden rendben van, kikerül a gyermekágyas osztályra. Ötödik napon varratszedés, hatodik napon – amennyiben gyermekét is rendben találja a gyermekgyógyász- távozhat az osztályról.

Császármetszést követően 48 órás szubintenzív megfigyelésre az őrzőszobába kerül, ahol műszerekkel, vér és vizelet vizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénakanüljén keresztül pótoljuk a folyadékvesztést, adjuk a gyógyszereket. Vizeletét min. 24 órán át katéteren vezetjük le. Inni csak kellően éber állapotban kap, enni pedig csak kellőképpen beindult bélműködés után. Műtét után a belek renyhébben működnek, ha gyógyszerekre nem reagálnak, vagy nagyon ritkán el is záródhatnak ismételt műtétre lehet szükség. Műtét után felléphet lázas állapot, melyet gyógyszerekkel csillapíthatunk. Zavartalan gyógyulás esetén – ha a gyermekgyógyász az újszülött gyermekét is hazaadhatónak tartja, a 6. napon varratszedést követően távozhat osztályunkról.

Várható következmények:

Mind hüvelyi úton, mind császármetszéssel való szülés után kb. hat héten át un. Gyermekágyi folyása lesz. Ez az első 1-2 napban szinte vér, majd egyre kevesebb és színtelenebb lesz. Hüvelyi szülés ill. császármetszés után is szülhet még a későbbiekben hüvelyi úton.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A hüvelyi szülés alternatív megoldása a császármetszés. Osztályunkon császármetszést az anya kérésére nem végzünk, csak szakmai indokok alapján. A szívófogó nem a császármetszés alternatív megoldása, hanem egy kényszerhelyzet, amikor üregben lévő koponyánál magzati érdekből a szülés gyors befejezésére van szükség. A császármetszésnek nincs alternatív megoldása.

Mi a teendő a szülés és császármetszés után, elbocsátást követően?

Távozás után családorvosát, ill. gyermekorvosát keresse fel. Hat hét múlva kontroll vizsgálaton jelenjen meg. Kontroll vizsgálatig kímélő életmód, valamint nemiélet tilalma javasolt.

A szülés, szívófogó illetve császármetszés elmaradásának következményei:

Ön és születendő gyermek meghalhat ill. súlyos, vissza nem fordítható egészségkárosodást szenvedhet.

Beleegyező nyilatkozat:

A szülésről, szívófogó, császármetszés műteti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

Szekszárd,.....év.....hó.....nap

Elutasító nyilatkozat:

A kezelőorvos részletes felvilágosítása- mely a beavatkozás elmaradás esetén előforduló következményeket is tartalmazta -ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

tanú aláírása

tanú aláírása

Szekszárd,.....év.....hó.....nap